





Física Geral I - F-128

Segundo semestre, 2012




Aula -1

Introdução, Generalidades.

Bem vindos!

- à Unicamp



UNICAMP

- à vida universitária

- a uma relação professor/aluno entre adultos



Introdução

- Relação da Física com outras ciências
- O método científico
- Grandezas Físicas Fundamentais
 - Experimentador
 - Relógio
 - Régua
 - Balança
- Ordens de grandeza, algarismos significativos
- Análise dimensional

Metas da Física


- Observar, descrever e entender a regularidade dos fenômenos naturais.
- Encontrar as leis gerais por trás das regularidades.
- Século XVI (Galileu Galilei): O Método Científico.

O Método Científico

- Observação e experimentação (reprodutibilidade): teste crucial na formulação das leis naturais
- A Física parte de dados experimentais
- Acordo com a experiência é o juiz supremo da validade de qualquer teoria: não vale autoridade, hierarquia, iluminação divina.
- Abstração e indução: simplificar para entender, construir modelos.
- Leis e teorias (novas previsões)
- Arma mais poderosa contra as pseudo-ciências, o charlatanismo, a enganação.


O Método Científico

Física Experimental



As grandezas fundamentais

- tempo: [T]



- comprimento: [L]



- massa: [M]



O tempo

- Relógio: qualquer movimento periódico
 - Nascer do sol: intervalo de um dia
 - Sucessão das estações: intervalo de um ano.
 - Outros movimentos celestes.
 - Galileu usou suas pulsações como relógio.
 - Movimento de um pêndulo.
 - Frequência da luz emitida por átomos.
- Decaimento radioativo, usado para medir tempo em escala geológica.
- Irreversibilidade (nascimento vs morte): o tempo parece ter um sentido! (entropia).

Relógios precisos

- Determinação da **longitude** : fundamental para a navegação
- Comparar hora local (posição do Sol) com hora de Greenwich
- Terra gira 360° em 24 horas, variação de uma hora  desvio de 15° de longitude.
- **John Harrison**, carpinteiro, século XVIII: melhora na metalurgia, **melhores molas** para relógios, 1 parte em 10^5 .



Padrão do tempo

- Até 1956, 1 s = $1/86400$ do dia solar médio (média sobre o ano de um dia)
- 1956: padrão baseado no ano solar.
- 1967: 13a Conferência Geral sobre Pesos e Medidas definiu 1s como 9.192.631.770 períodos da radiação de uma transição atômica especificada do Césio 133 (definição do relógio atômico).
- 1999: NIST-F1, Padrão atual (relógio atômico)

A medição moderna do tempo

Relógio Atômico


Átomos de Césio 133 têm uma transição numa frequência de 9.192.631.770 ciclos/s (Hz).

Os átomos absorvem energia na cavidade de microondas e ficam em ressonância.

Átomos de Césio sempre emitem nesta mesma frequência: **bom padrão de medida de tempo.**

Em 1967, na 13a. Conferência Geral de Pesos e Medidas, foi definido como **padrão de tempo:**

1s  9.192.631.770 ciclos de uma transição hiperfina do césio 133



Uma Aplicação: GPS

- O Global Positioning System (GPS) consiste de uma rede de mais de 24 satélites orbitando a 20.000 km de altitude, de modo que, o tempo todo, pelo menos 4 deles estejam “visíveis” de qualquer ponto da Terra.
- Cada satélite tem um relógio atômico.
- Cada receptor tem apenas um relógio de quartzo.
- Precisão de poucos metros.



Alguns tempos característicos

Tempos	Segundos
Menor tempo concebível na física atual, denominado tempo de Planck	10^{-43}
Tempo para a luz atravessar o núcleo	10^{-23}
Período de oscilação da luz visível	10^{-15}
Período de oscilação de um rádio FM	10^{-8}
Período do motor de um carro veloz	10^{-2}
Período da batida cardíaca	10^0
Duração do dia	10^5
Duração do ano	10^7
Duração da vida humana	10^9
Desde o surgimento da escrita	10^{11}
Desde o surgimento do homem	10^{13}
Idade da Terra	10^{17}
Idade do Universo	10^{18}

Medida de tempos longos: datação com ^{14}C .

- Meia vida do $^{14}_6\text{C}$: $T_{1/2} = 5.730$ anos
- Equilíbrio dinâmico na atmosfera $^{14}_7\text{N} \gg ^{14}_6\text{C}$ (raios cósmicos)
- A fração de $^{14}_6\text{C}$ (1 átomo para cada $7,8 \times 10^{11}$ de $^{12}_6\text{C}$) é constante em organismos vivos pela constante troca de CO_2 com o ambiente (fotossíntese).
- A fração de $^{12}_6\text{C}$ não muda após a morte, porém existe decaimento do $^{14}_6\text{C}$.
- Comparando a relação $^{14}_6\text{C}/^{12}_6\text{C}$ em fósseis determina-se a sua idade.
- Espécimes da ordem de 20.000 anos podem ser datados.



E você ?

- E o seu carbono 14 pessoal – no seu corpo ??
- 18 % da sua massa é de carbono (todos os isótopos), da qual aprox. $1/10^{12}$ é de carbono 14
- Ele decai: ${}_{6}^{14}C \rightarrow {}_{7}^{14}N + \text{elétron} + \text{anti-neutrino}_{\text{eletronico}}$
- Se sua massa é 60 kg, 10.8 kg são de carbono =>
- $\sim 5.4 \times 10^{26}$ carbonos (total) => 5.4×10^{14} são de ${}_{6}^{14}C$, que estão decaindo ... $A = 0,693 N_{14} / T_{1/2}$
- Você está emitindo eletrons e anti-neutrinos, a uma taxa $A = 2100/\text{s}$ (chama-se atividade)

O metro Padrão

- 1792- International System (SI) Metro, 1 m = 10^{-7} da distância do polo norte ao equador (meridiano de Paris)
- 1797- Barra de platina-irídio
- 1960- CGPM: 1 m = 1.650.763,73 comprimentos de onda da transição 2p10 - 5d5 do kriptônio-86
- 1983- Distância percorrida pela luz no vácuo em $1/299.792.458$ de segundo. Este intervalo foi escolhido para que a velocidade da luz seja definida como $c = 299.792.458$ m/s.



Q1: Ordem de Grandeza

Qual a ordem de grandeza de uma pessoa adulta (em metros)?

- 1) 10^0
- 2) 10^1
- 3) 10^{-1}
- 4) 10^2
- 5) nenhuma das acima

Alguns comprimentos característicos

Comprimentos	Metros	
Menor distância conceitível na física atual, denominada comprimento de Planck	10^{-35}	Métodos indiretos
Menor dimensão já pesquisada	10^{-21}	
Dimensão do núcleo atômico	10^{-15}	
Dimensão do átomo	10^{-10}	Microscopia eletrônica
Dimensão de um vírus	10^{-8}	
Dimensão de uma bactéria	10^{-5}	
Comprimento de onda da luz	10^{-6}	Microscopia ótica
Altura do homem	10^0	
Diâmetro da Terra	10^7	
Distância até o Sol	10^{11}	Métodos diretos
Distância até a estrela mais próxima	10^{16}	
Dimensão da Via Láctea	10^{21}	
Distância até Andrômeda	10^{22}	Luminosidade
Dimensão do Universo	10^{26}	

Alguns comprimentos característicos

Video: “Powers of Ten”

<http://www.youtube.com/watch?v=L5L7K0pbU4I>

Outra sugestão:

<http://htwins.net/scale2/scale2.swf?bordercolor=white>

O Quilograma Padrão

- 1889: a 1a Conferência Geral sobre Pesos e Medidas definiu o padrão do quilograma como uma peça de Platina-Irídio, mantida no IBWM.
- Um segundo padrão de massa: o átomo de carbono-12, ao qual se atribuiu uma massa de 12 unidades de massa atômica (u), sendo que :
- $1\text{u} = 1,66053886 \times 10^{-27} \text{ kg}$



Algumas massas características

Massas	Quilogramas
Massa do elétron	10^{-30}
Massa do próton	10^{-27}
Massa de um vírus	10^{-21}
Massa de uma bactéria	10^{-12}
Massa de uma pulga	10^{-7}
Massa do homem	10^2
Massa do Pão de Açúcar	10^{10}
Massa da atmosfera	10^{19}
Massa dos oceanos	10^{21}
Massa da Terra	10^{25}
Massa do Sol	10^{30}
Massa da Via Láctea	10^{41} a 10^{42}
Massa do Universo	10^{53} a 10^{54}

Unidades SI

UNIDADES SI

Nome	Símbolo	Grandeza
metro	m	Comprimento
kilograma	kg	Massa
segundo	s	Tempo
ampère	A	Corrente elétrica
kelvin	K	Temperatura termodinâmica
mol	mol	Quantidade de substância
candela	cd	Intensidade luminosa

Estimativa

Dá a idéia da **ordem de grandeza** do parâmetro em questão

Volume de um lago





FIGURE 1–10 Example 1–6. (a) How much water is in this lake? (Photo is of one of the Rae Lakes in the Sierra Nevada of California.) (b) Model of the lake as a cylinder. [We could go one step further and estimate the mass or weight of this lake. We will see later that water has a density of 1000 kg/m^3 , so this lake has a mass of about $(10^3 \text{ kg/m}^3)(10^7 \text{ m}^3) \approx 10^{10} \text{ kg}$, which is about 10 billion kg or 10 million metric tons. (A metric ton is 1000 kg, about 2200 lbs, slightly larger than a British ton, 2000 lbs.)]

Tamanho de uma folha de papel



FIGURE 1–11 Example 1–7. A micrometer, which is used for measuring small thicknesses.

Ordem de Grandeza

Ordem de grandeza: potência de dez de um número escrito em notação científica.

Exemplo: se $A = 2,3 \times 10^4$ e $B = 7,8 \times 10^5$, a ordem de grandeza de A é 4 e a ordem de grandeza *mais próxima* de B é 6.

Questão: qual a distância aproximada entre esta sala e a entrada do bandejão?

- a) $1\text{ m} = 10^0\text{ m}$
- b) $10\text{ m} = 10^1\text{ m}$
- c) $100\text{ m} = 10^2\text{ m}$
- d) $1000\text{ m} = 10^3\text{ m}$

Algarismos significativos

Mantêm-se nos cálculos somente a quantidade de algarismos compatível com as incertezas.

Questão: qual a distância aproximada entre esta sala e a entrada do bandejão?



$$\begin{aligned} L &= 350 \pm 10 \text{ m} \\ &= (3,5 \pm 0,1) \times 10^2 \text{ m} \end{aligned}$$

(dois algarismos
significativos bastam)

Algarismos significativos

Curiosidade: precisão das medidas atuais é impressionante! Quando escrevemos a velocidade da luz como

$$c = 299\ 792\ 458\ m/s$$

enfatizamos que temos 9 algarismos significativos, e trabalharemos com a precisão de 1 em 10^8 (seria como se medíssemos a distância daqui ao bandeijão com precisão de uma bactéria). Se escrevemos:

$$c = 3 \cdot 10^8\ m/s$$

indicamos que trabalharemos em uma precisão “normal” (uma parte em 10, ou 100, ou 1000...).

Análise Dimnensional

A análise dimensional é a área da Física que se interessa pelas unidades de medida das grandezas físicas. Ela tem grande utilidade na previsão, verificação e resolução de equações que relacionam as grandezas físicas, garantindo sua correção e homogeneidade. A análise dimensional usa o fato de que as dimensões podem ser tratadas como grandezas algébricas, isto é, podemos somar ou subtrair grandezas nas equações **somente** quando elas possuem as mesmas dimensões.

Uma equação só pode ser fisicamente verdadeira se ela for dimensionalmente homogênea.

Em análise dimensional, neste curso, utilizamos apenas três grandezas: massa, comprimento e tempo, que são representadas pelas letras M, L e T respectivamente. Podemos, a partir dessas grandezas, determinar uma série de outras.

Exemplo 1:

Tempo necessário para um objeto atingir o solo, solto a partir de uma altura h :

Hipótese: este tempo depende da massa do objeto, da altura h e da aceleração da gravidade g :

$$t \propto m^\alpha \times h^\beta \times g^\gamma \quad \rightarrow \quad [T] = [M]^\alpha \times [L]^\beta \times \left(\frac{[L]}{[T]^2} \right)^\gamma$$

Exemplo 1:

Tempo necessário para um objeto atingir o solo, solto a partir de uma altura h :

Hipótese: este tempo depende da massa do objeto, da altura h e da aceleração da gravidade g :

$$t \propto m^\alpha \times h^\beta \times g^\gamma \quad \rightarrow \quad [T] = [M]^\alpha \times [L]^\beta \times \left(\frac{[L]}{[T]^2} \right)^\gamma$$

Resposta (possível):

$$\left. \begin{array}{l} \alpha = 0 \\ \beta = +1/2 \\ \gamma = -1/2 \end{array} \right\} \quad \rightarrow \quad t \propto \sqrt{\frac{h}{g}}$$

Exemplo 2:

Mas sabemos que a vida é mais complicada... Como implementar resistência do ar?

Hipótese: este tempo depende da densidade do meio, da área transversal do objeto, e da sua velocidade:

$$F \propto \rho_{ar}^{\alpha} \times area^{\beta} \times v^{\gamma} \quad \rightarrow \quad \frac{[M][L]}{[T]^2} = \left(\frac{[M]}{[L]^3} \right)^{\alpha} \times ([L]^2)^{\beta} \times \left(\frac{[L]}{[T]} \right)^{\gamma}$$

Exemplo 2:

Mas sabemos que a vida é mais complicada... Como implementar resistência do ar?

Hipótese: este tempo depende da densidade do meio, da área transversal do objeto, e da sua velocidade:

$$F \propto \rho_{ar}^{\alpha} \times area^{\beta} \times v^{\gamma} \rightarrow \frac{[M][L]}{[T]^2} = \left(\frac{[M]}{[L]^3} \right)^{\alpha} \times ([L]^2)^{\beta} \times \left(\frac{[L]}{[T]} \right)^{\gamma}$$

Resposta (possível):

$$\left. \begin{array}{l} \alpha = 1 \\ \beta = 1 \\ \gamma = +2 \end{array} \right\} \rightarrow F \propto \rho.A.v^2$$

Possível, mas não única Fórmula válida para altas velocidades (ver cap.6). O que mais poderíamos incluir?

Análise dimensional não é tudo!

MY HOBBY: ABUSING DIMENSIONAL ANALYSIS

$$\frac{\text{PLANCK ENERGY}}{\text{PRESSURE AT THE EARTH'S CORE}} \times \frac{\text{PRIUS COMBINED EPA GAS MILEAGE}}{\text{MINIMUM WIDTH OF THE ENGLISH CHANNEL}} = \pi$$

IT'S CORRECT TO WITHIN EXPERIMENTAL ERROR, AND THE UNITS CHECK OUT. IT MUST BE A FUNDAMENTAL LAW.



Exemplo 3:

Num movimento oscilatório, a abscissa (x) de uma partícula é dada em função do tempo (t) por:

$$x = A + B \cos(Ct)$$

onde A , B e C são parâmetros constantes não nulos.

Adotando como fundamentais as dimensões M (massa), L (comprimento) e T (tempo), obtenha as fórmulas dimensionais de A , B e C .

Resolução: Levando-se em conta o princípio da homogeneidade dimensional, deve-se ter:

$$[A] = [x] = L \text{ fi } [A] = M^0 LT^0$$

Como a função *cosseno* é aplicada a números puros:

$$[C][t] = M^0 L^0 T^0 \text{ fi } [C] = M^0 L^0 T^{-1}$$

$$[B][\cos(Ct)] = [x] = L \text{ fi } [B] = [x] = M^0 LT^0$$